



AANBEVELINGEN VOOR EEN GOEDE BEWARING VAN POOTGOED

Voor de start van een nieuw groeiseizoen moet alle aandacht uitgaan naar de goede bewaring van pootgoed. Deze kostbare input vormt immers de basis voor een succesvolle aardappelteelt. Hier volgen enkele nuttige aanbevelingen.

BESTELLING EN LEVERING

Laat de plant leveren volgens de geplande plantdatum. Laat niet te vroeg leveren, tenzij je de opslag op de boerderij kunt regelen.

TEELT EN OPSLAG VAN HET POOTGOED

Vraag je leverancier naar de omstandigheden waaronder het pootgoed is geteeld en opgeslagen. Wat vooral belangrijk is, zijn de omstandigheden waaronder de plant is opgeslagen tussen het moment van verpakken (in zakken doen) en het moment van certificering en levering. Wat is de verpakkingsdatum? Bij welke temperatuur werd het pootgoed dan opgeslagen? Wat is de datum waarop het pootgoed uit de koelkast is gehaald?

ETIKETTEN / FYTOSANITAIR PASPOORT

Bij levering moet elke partij planten vergezeld zijn van een fyto sanitair paspoort: 1 etiket per zak, per big-bag of per bulkwagen. In de laatste 2 gevallen moet de container verzegeld zijn. In geval van niet-naleving, breng je de regionale certificeringsautoriteiten (Agentschap Landbouw en Zeevisserij) of het FAVV (Lokale controle-eenheid voor uw provincie - <https://favv-afscab.nl/contact/lce>) op de hoogte.

CONTROLE

Controleer de kwaliteit van het pootgoed bij aankomst op de boerderij en voor het lossen. Zodra de plant gelost is, heb je hem formeel geaccepteerd! Neem een monster, was de knollen en controleer op ziektes (zoals rhizoctonia, zilverschurft, droogrot en natrot), maar ook op gebreken (zoals

doorgesneden knollen, schade door rooien en drukplekken) en grootte. Laat een monster op kamertemperatuur om het uitlopen te testen (aantal en kracht van de scheuten, uitlooptijd, enz.) en neem foto's (op de dag van ontvangst en vervolgens één en twee weken nadat ze op kamertemperatuur zijn gebracht).

NORMEN

Gecertificeerd pootgoed moet voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn vastgelegd in de controle- en certificeringsvoorschriften van het land van herkomst. De handel in planten valt onder de RUCIP-normen (zie https://belgapom.be/_library/_files/rucip/RUCIP_2017_NL.pdf). Als er problemen of gebreken worden gevonden, moet de handelaar-leverancier van het pootgoed zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

VOCHT

Laat de plant niet in de regen staan! Een laagje water kan bacteriën aanmoedigen om naar de lenticellen te migreren of de ontwikkeling van sporen (zilverschurft) aanmoedigen en de plant infecteren. Als er kans is op vorst, haal het pootgoed plant dan naar binnen en/of dek het voldoende af.

KIEMREMMINGSMIDDELEN

Bewaar pootgoed nooit samen met consumptieaardappelen die behandeld zijn met kiemremmers! Door de dampwerking kan het kiemremmersmiddel in consumptieaardappelen naar het pootgoed migreren en de kiemkracht aantasten.

TEMPERATUUR

Als het pootgoed niet onmiddellijk wordt geplant, is opslag tussen 7°C en 10°C ideaal. Hogere temperaturen leiden tot versnelde ontkieming.

LICHT

In afwachting van het planten kan het pootgoed in het licht worden bewaard.

VERLUCHTING

Zorg ervoor dat het pootgoed goed verlucht wordt. Dit voorkomt temperatuurverschillen en condensatie, wat kan leiden tot ontkieming en de ontwikkeling van ziektes. Als het pootgoed in zakken wordt geleverd, pak de pallets dan uit om lucht tussen de zakken te laten circuleren. Containers en big bags zijn transportmiddelen, geen opslag. Idealiter sla je pootgoed op in kratten of los op beton in een dunne laag, in een schone ruimte en in hoeveelheden die ventilatie toelaten.

KIEMEN

Probeer het pootgoed zo lang mogelijk kiemvrij te houden. Ontkiemen versnelt de veroudering en kan leiden tot de ontwikkeling van ziekten.

WITTE PUNTEN

Bij het planten moet het pootgoed "wakker" zijn, wat betekent dat er kleine witte scheuten (witte puntjes) zichtbaar moeten zijn. Als dit niet het geval is, bestaat het risico, vooral in ongunstige groeiomstandigheden, dat de periode tussen planten en opkomen te lang wordt. In dit geval kunnen ziekten (zoals rhizoctonia of fusarium) het pootgoed en de kiemen aantasten, wat leidt tot een slechte of onregelmatige opkomst.

VERWARMING

Variëteiten met een lange rustperiode (zoals Agria en Challenger) hebben hun maximale groeicapaciteit nog niet bereikt wanneer ze geplant worden na opslag in de koelkast. Dit resulteert in een tragere opkomst en een tragere ontwikkeling. Dergelijke variëteiten moeten lang genoeg uit de koelkast worden gehaald voordat ze worden geplant.

TIJD TUSSEN HET UIT DE KOELING HALEN EN HET PLANTEN

Laat het pootgoed geleidelijk opwarmen wanneer het uit de koelkast wordt gehaald. Idealiter zit er 2 weken tussen het uit de koelkast halen en het planten. Bij langzaam ontkiemende variëteiten kan dit 3 tot 5 weken duren.

GROND

Vermijd planten in koude, vochtige grond. Bij het planten moet de grond minstens 10°C zijn. Neem het advies over dichtheid en plantdiepte in acht. Te diep planten verhoogt het risico op rot in een natte lente.

REGISTRATIE EN TRACEERBAARHEID

Noteer voor elk geplant perceel de variëteit, de grootte, het partijnummer, ... Bewaar ook de fyto-sanitaire labels voor elke zak of partij gedurende minstens 5 jaar. Meng nooit partijen.

COMMUNICATIE

Als er voor het planten of op het veld een probleem wordt ontdekt (zoals opkomst, groeikracht, virusziekten), neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier (in verschillende zaailingsectoren is 15 juni de uiterste datum voor klachten) met zoveel mogelijk informatie (partijnummer, ras, klasse, grootte, leveringsdatum, plantdatum, behandeling van de zaailing, ...).

STAAL

Houd een staal van het pootgoed apart om te zien hoe dit zich ontwikkelt qua kieming en kwaliteit in de weken na het planten.

Meer informatie:

PCA – Tel. 09 381 86 91 – www.pcainfo.be

Inagro – Tel. 051 27 32 42 – www.inagro.be